

Viscago lævis, inaperto flore. *Dill. elth.* 424. t. 315. f. 407.

Habitat in Europa australi. ☉

cretica.

20. **SILENE** erecta lævis, calycibus erectis fuleatis, petalis emarginatis. *Hort. ups.* 112. *

Viscago foliis inferioribus bellidis, superioribus tunicæ, calyce strictiore & turgidior. *Dill. elth.* 422. t. 314. f. 404. 405.

Habitat in Creta.

portensis.

21. **SILENE** caule dichotomo paniculato, calycibus striatis, petalis bifidis, foliis linearibus.

Silene caule erecto, pedunculis longissimis erectis unifloris, foliis lineari-lanceolatis, *Roy. lugdb.* 447. ?

Habitat in Lusitania. ☉

Habitus S. inapertæ, at Folia angustiora, & Calyces longitudinaliter striati. Planta *spithamea, brachiata, dichotoma.* Folia linearia acuta glabra. Pedunculi filiformes, angustissimi, longi, erecti, e dichotomia caulis, uniflori. Calyces clavati, longi, purpurascetes, striis alternis albis. Stamina longitudine fere corollæ.

Muscipula.

22. **SILENE** petalis bifidis, caule dichotomo, floribus axillaribus sessilibus, foliis glabris.

Silene floribus triflytis, foliis lanceolatis sessilibus, capsulis trilocularibus, floribus ternis. *Sauv. monsp.* 145.

Lychnis sylvestris viscosa rubra altera. *Baub. pin.* 205.

Lychnis sylvestris 3. *Clus. hist.* 1. p. 289.

Habitat in Hispania, G. Narbonensi.

polyphylla.

23. **SILENE** foliis fasciculatis setaceis: ramorum florentium oppositis. *Roy, lugdb.* 447.

Lychnis sylvestris, plurimis foliolis simul junctis. *Baub. pin.* 205.

Lychnis sylvestris VIII. *Clus. hist.* 1. p. 290.

Habitat in Pannonia, Austria, Bohemia. 2

LYCHNIS.

Armeria.

24. **SILENE** floribus fasciculatis fastigiatis, foliis superioribus cordatis glabris. *Hort. ups.* 110.

Silene foliis lanceolato-ovatis glabris, floribus terminalibus fasciculatis fastigiatis. *Hort. cliff.* 172. *Roy, lugdb.* 446. *Sauv. monsp.* 153.

Lych-

Lychnis viscosa purpurea latifolia lævis. *Baub. pin.* 205

Armerius flos quartus. *Dod. pempt.* 176.

Habitat in Anglia, Gallia. ☉

25. **SILENE** floribus erectis, petalis emarginatis, calycibus teretibus, foliis lanceolatis. *Fl. suec.* 367. *It. W'goth.* 144. *

Silene floribus erectis laxè distantibus, caule dichotomo *Fl. lapp.* 183.

Alpine alpina glabra. *Baub. pin.* 251. *prodr.* 118.

Auricula muris alpina glabra. *Baub. hist.* 3. p. 360.

β. *Caryophyllus holosteus alpinus gramineus.* *Baub. pin.* 210. *prodr.* 104. *Burf. XI.* 117.

Habitat in montibus aridis Sueciæ, Helvetiæ. ♂

Varietas β. foliis linearibus in umbra nata.

26. **SILENE** caulibus unifloris, pedunculis longitudine caulis.

Caryophyllus faxifragus. *Baub. pin.* 211.

Saxifraga antiquorum quibusdam. *Baub. hist.* 3. p. 338

Habitat in montibus cretaceis Galliæ, Italiæ. 2

Radix lignosa, ramosa. Caules plures, digitales, simplicis simi, glabri. Folia opposita linearia acuta glabra, per 4 ad 6 oppositiones. Pedunculus terminalis, filiformi longitudine caulis; raro pedunculus alter lateralis. Flores unicus. Calyx clavatus glaber. Petala bifida limba calyce brevior.

* *

27. **SILENE** caule folioso herbaceo, foliis lanceolatis acutis glabris, calycibus erectis. *Hort. cliff.* 171. *Roy, lugdb.* 446.

Lychnis orientalis, bupleuri folio. *Tournef. cor.* 2. itin 2. p. 139. t. 154.

Habitat in Persia.

STELLARIA.

1. **STELLARIA** foliis cordatis petiolatis, pedunculis ramosis.

Alpine altissima nemorum. *Baub. pin.* 251.

Alpine montana hederacea maxima. *Col. eephr.* 1. p. 285. t. 290.

Habitat in Europæ nemoribus.

2. **STELLARIA** foliis ovatis sessilibus, caule dichotomo floribus solitariis, pedunculis fructiferis reflexis.

D d 3

Hab.

Viscago lævis, inaperto flore. *Dill. elth.* 424. t. 315. f. 407.

Habitat in Europa australi. ☉

cretica.

20. **SILENE** erecta lævis, calycibus erectis fuleatis, petalis emarginatis. *Hort. ups.* 112. *

Viscago foliis inferioribus bellidis, superioribus tunicæ, calyce strictiore & turgidior. *Dill. elth.* 422. t. 314. f. 404. 405.

Habitat in Creta.

portensis.

21. **SILENE** caule dichotomo paniculato, calycibus striatis, petalis bifidis, foliis linearibus.

Silene caule erecto, pedunculis longissimis erectis unifloris, foliis lineari-lanceolatis, *Roy. lugdb.* 447. ?

Habitat in Lusitania. ☉

Habitus S. inapertæ, at Folia angustiora, & Calyces longitudinaliter striati. Planta *spithamea, brachiata, dichotoma.* Folia linearia acuta glabra. Pedunculi filiformes, angustissimi, longi, erecti, e dichotomia caulis, uniflori. Calyces clavati, longi, purpurascens, striis alternis albis. Stamina longitudine fere corollæ.

Muscipula.

22. **SILENE** petalis bifidis, caule dichotomo, floribus axillaribus sessilibus, foliis glabris.

Silene floribus triflytis, foliis lanceolatis sessilibus, capsulis trilocularibus, floribus ternis. *Sauv. monsp.* 145.

Lychnis sylvestris viscosa rubra altera. *Baub. pin.* 205.

Lychnis sylvestris 3. *Clus. hist.* 1. p. 289.

Habitat in Hispania, G. Narbonensi.

polyphylla.

23. **SILENE** foliis fasciculatis setaceis: ramorum florentium oppositis. *Roy, lugdb.* 447.

Lychnis sylvestris, plurimis foliolis simul junctis. *Baub. pin.* 205.

Lychnis sylvestris VIII. *Clus. hist.* 1. p. 290.

Habitat in Pannonia, Austria, Bohemia. 2

LYCHNIS.

Armeria.

24. **SILENE** floribus fasciculatis fastigiatis, foliis superioribus cordatis glabris. *Hort. ups.* 110.

Silene foliis lanceolato-ovatis glabris, floribus terminalibus fasciculatis fastigiatis. *Hort. cliff.* 172. *Roy, lugdb.* 446. *Sauv. monsp.* 153.

Lych-

Lychnis viscosa purpurea latifolia lævis. *Baub. pin.* 205

Armerius flos quartus. *Dod. pempt.* 176.

Habitat in Anglia, Gallia. ☉

25. **SILENE** floribus erectis, petalis emarginatis, calycibus teretibus, foliis lanceolatis. *Fl. suec.* 367. *It. W'goth.* 144. *

Silene floribus erectis laxè distantibus, caule dichotomo *Fl. lapp.* 183.

Alpine alpina glabra. *Baub. pin.* 251. *prodr.* 118.

Auricula muris alpina glabra. *Baub. hist.* 3. p. 360.

β. Caryophyllus holosteus alpinus gramineus. *Baub. pin.* 210. *prodr.* 104. *Burf. XI.* 117.

Habitat in montibus aridis Sueciæ, Helvetiæ. 3

Varietas β. foliis linearibus in umbra nata.

26. **SILENE** caulibus unifloris, pedunculis longitudine caulis.

Caryophyllus faxifragus. *Baub. pin.* 211.

Saxifraga antiquorum quibusdam. *Baub. hist.* 3. p. 338

Habitat in montibus cretaceis Galliæ, Italiæ. 2

Radix lignosa, ramosa. Caules plures, digitales, simplicis simi, glabri. Folia opposita linearia acuta glabra, per 4 ad 6 oppositiones. Pedunculus terminalis, filiformi longitudine caulis; raro pedunculus alter lateralis. Flores unicus. Calyx clavatus glaber. Petala bifida limba calyce brevior.

* *

27. **SILENE** caule folioso herbaceo, foliis lanceolatis acutis glabris, calycibus erectis. *Hort. cliff.* 171. *Roy, lugdb.* 446.

Lychnis orientalis, bupleuri folio. *Tournef. cor.* 2. itin 2. p. 139. t. 154.

Habitat in Persia.

STELLARIA.

1. **STELLARIA** foliis cordatis petiolatis, pedunculis ramosis.

Alpine altissima nemorum. *Baub. pin.* 251.

Alpine montana hederacea maxima. *Col. eephr.* 1. p. 285. t. 290.

Habitat in Europæ nemoribus.

2. **STELLARIA** foliis ovatis sessilibus, caule dichotomo floribus solitariis, pedunculis fructiferis reflexis.

D d 3

Hab

Viscago lævis, inaperto flore. *Dill. elth.* 424. t. 315. f. 407.

Habitat in Europa australi. ☉

cretica.

20. **SILENE** erecta lævis, calycibus erectis fuleatis, petalis emarginatis. *Hort. ups.* 112. *

Viscago foliis inferioribus bellidis, superioribus tunicæ, calyce strictiore & turgidior. *Dill. elth.* 422. t. 314. f. 404. 405.

Habitat in Creta.

portensis.

21. **SILENE** caule dichotomo paniculato, calycibus striatis, petalis bifidis, foliis linearibus.

Silene caule erecto, pedunculis longissimis erectis unifloris, foliis lineari-lanceolatis, *Roy. lugdb.* 447. ?

Habitat in Lusitania. ☉

Habitus S. inapertæ, at Folia angustiora, & Calyces longitudinaliter striati. Planta *spithamea, brachiata, dichotoma.* Folia linearia acuta glabra. Pedunculi filiformes, angustissimi, longi, erecti, e dichotomia caulis, uniflori. Calyces clavati, longi, purpurascens, striis alternis albis. Stamina longitudine fere corollæ.

Muscipula.

22. **SILENE** petalis bifidis, caule dichotomo, floribus axillaribus sessilibus, foliis glabris.

Silene floribus triflytis, foliis lanceolatis sessilibus, capsulis trilocularibus, floribus ternis. *Sauv. monsp.* 145.

Lychnis sylvestris viscosa rubra altera. *Baub. pin.* 205.

Lychnis sylvestris 3. *Clus. hist.* 1. p. 289.

Habitat in Hispania, G. Narbonensi.

polyphylla.

23. **SILENE** foliis fasciculatis setaceis: ramorum florentium oppositis. *Roy, lugdb.* 447.

Lychnis sylvestris, plurimis foliolis simul junctis. *Baub. pin.* 205.

Lychnis sylvestris VIII. *Clus. hist.* 1. p. 290.

Habitat in Pannonia, Austria, Bohemia. 2

LYCHNIS.

Armeria.

24. **SILENE** floribus fasciculatis fastigiatis, foliis superioribus cordatis glabris. *Hort. ups.* 110.

Silene foliis lanceolato-ovatis glabris, floribus terminalibus fasciculatis fastigiatis. *Hort. cliff.* 172. *Roy, lugdb.* 446. *Sauv. monsp.* 153.

Lych-

Lychnis viscosa purpurea latifolia lævis. *Baub. pin.* 205

Armerius flos quartus. *Dod. pempt.* 176.

Habitat in Anglia, Gallia. ☉

25. **SILENE** floribus erectis, petalis emarginatis, calycibus teretibus, foliis lanceolatis. *Fl. suec.* 367. *It. W'goth.* 144. *

Silene floribus erectis laxè distantibus, caule dichotomo *Fl. lapp.* 183.

Alpine alpina glabra. *Baub. pin.* 251. *prodr.* 118.

Auricula muris alpina glabra. *Baub. hist.* 3. p. 360.

β. *Caryophyllus holosteus alpinus gramineus.* *Baub. pin.* 210. *prodr.* 104. *Burf. XI.* 117.

Habitat in montibus aridis Sueciæ, Helvetiæ. ♂

Varietas β. foliis linearibus in umbra nata.

26. **SILENE** caulibus unifloris, pedunculis longitudine caulis.

Caryophyllus faxifragus. *Baub. pin.* 211.

Saxifraga antiquorum quibusdam. *Baub. hist.* 3. p. 338

Habitat in montibus cretaceis Galliæ, Italiæ. 2

Radix lignosa, ramosa. Caules plures, digitales, simplicis simi, glabri. Folia opposita linearia acuta glabra, per 4 ad 6 oppositiones. Pedunculus terminalis, filiformi longitudine caulis; raro pedunculus alter lateralis. Flores unicus. Calyx clavatus glaber. Petala bifida limba calyce brevior.

* *

27. **SILENE** caule folioso herbaceo, foliis lanceolatis acutis glabris, calycibus erectis. *Hort. cliff.* 171. *Roy lugdb.* 446.

Lychnis orientalis, bupleuri folio. *Tournef. cor.* 2. itin 2. p. 139. t. 154.

Habitat in Persia.

STELLARIA.

1. **STELLARIA** foliis cordatis petiolatis, pedunculis ramosis.

Alpine altissima nemorum. *Baub. pin.* 251.

Alpine montana hederacea maxima. *Col. eephr.* 1. p. 285. t. 290.

Habitat in Europæ nemoribus.

2. **STELLARIA** foliis ovatis sessilibus, caule dichotomo floribus solitariis, pedunculis fructiferis reflexis.

D d 3

Hab.

при основаніи съ рѣсничками. Цвѣты по одиночкѣ или по два. Чашечка цилиндрическая, голая или по жилкамъ слегка пушистая, съ продолговатыми, тупыми зубцами, по краю бѣло-перепончатыми. Лепестки бѣлые, безъ привѣнчика, двураздѣльные. Коробочка продолговатая. 4. На мѣлу. Югъ.

1137. (9). *S. acaulis* L. Стебли образуютъ густую дерновинку съ укороченными вѣточками. Листья скученные, линейные, острые, голые, у основанія рѣсничатые. Цвѣты сидячіе или на ножкахъ. Чашечка колокольчатая, красноватая, безъ жилокъ, съ тупыми, рѣсничатыми, яйцевидными долями. Лепестки розовые, съ маленькимъ привѣнчикомъ, глубоко-выемчатые. Коробочка продолговатая. 4. На горахъ. Сѣверъ, Востокъ. На сѣверѣ (Новая Земля) указана разновидность:

var. *exsara* (All.) D. C. Цвѣты сидячіе, вдвое меньше. Лепестки едва выемчатые.

1138. (10). *S. rupestris* L. Стебли вѣтвистые отъ основанія, прямые, голые. Листья ланцетные, острые. Цвѣты на длинныхъ цвѣтоножкахъ. Чашечка обратно-коническая, голая. Лепестки бѣлые или мясо-красные. 4. На горахъ. Сѣверъ, Финляндія.

1139. (11). *S. Armeria* L. Стебли прямые, простые или вверху немного вѣтвистые, голые съ клейкими узлами. Листья сизоватые, нижніе лопатчатые, верхніе овально-ланцетные, острые, у основанія полусердцевидно-стеблеобъемлющіе. Чашечка красноватая, съ овально-округлыми зубцами, по краю бѣло-окаймленными. Лепестки розовые съ привѣнчикомъ. Коробочка продолговатая. ⊙. На поляхъ и каменистыхъ мѣстахъ. Средн., Югъ, Юго-Западъ, Западъ.

var. *compacta* (Fisch). Соцвѣтіе густое. Листья нижніе ланцетно-лопатчатые, верхніе овально-продолговатые у основанія округло-стеблеобъемлющіе. ⊙. Югъ. *S. compacta* Fisch.

1140. (12). *S. longiflora* Ehrh. Стебли прямые, голые, вверху линкіе. Листья нижніе продолговато-ланцетные, острые, вытянутые въ длинный черешокъ, верхніе ланцетно-линейные. Чашечка длиной до 25 мм., длинноцилиндрическая. Лепестки бѣлые, двураздѣльные съ овально-продолговатыми долями, съ привѣнчикомъ. Коробочка продолговатая, на ножкѣ почти равной коробочкѣ. 4. По степямъ и каменистымъ мѣстамъ. Югъ, Крымъ.

1141. (13). *S. chlorantha* (Willd.) Ehrh. Стебли прямые, голые. Нижнія листья сближенные, лопатчато-удлиненные, суженные въ длинный черешокъ, у основанія рѣсничатый. Верхніе меньшіе, линейные, всѣ зубренно-рѣсничатые. Чашечка продолговато-булавовидная, зубцы чашечки овально-округлые, по краю бѣло-окаймленные, густо-рѣсничатые. Лепестки зеленоватые, глубокораздѣльные, ноготки лепестковъ выдаются изъ чашечки. 4. По сосновымъ лѣсамъ и песчанымъ мѣстамъ. По всей области.

1142. (14). *S. tatarica* (L.) Pers. Стебли прямые, слегка пушистые. Листья линейно-ланцетные, острые, по краю зубреные. Чашечка продолговато-булавчатая съ овальными островатыми зубцами, по краю бѣлопленчатыми, рѣсничатыми. Лепестки бѣлые, двураздѣльные безъ привѣнчика, ноготки лепестковъ выдаются изъ чашечки. Коробочка продолговатая на короткой ножкѣ. 4. По песчанымъ мѣстамъ и сосновымъ борамъ. По всей области.

1143. (15). *S. tenuis* Willd. Стебли прямые голые, или клейкіе, одиночные или образуютъ дерновинки. Листья скученные при основаніи стебля, узко-линейно-ланцетные или линейно-щетиновидные, голые, рѣдко пушистые, у основанія рѣсничатые, пленчато-расширенные стеблеобъемлющіе. Стеблевые

при основаніи съ рѣсничками. Цвѣты по одиночкѣ или по два. Чашечка цилиндрическая, голая или по жилкамъ слегка пушистая, съ продолговатыми, тупыми зубцами, по краю бѣло-перепончатыми. Лепестки бѣлые, безъ привѣнчика, двураздѣльные. Коробочка продолговатая. 4. На мѣлу. Югъ.

1137. (9). *S. acaulis* L. Стебли образуютъ густую дерновинку съ укороченными вѣточками. Листья скученные, линейные, острые, голые, у основанія рѣсничатые. Цвѣты сидячіе или на ножкахъ. Чашечка колокольчатая, красноватая, безъ жилокъ, съ тупыми, рѣсничатыми, яйцевидными долями. Лепестки розовые, съ маленькимъ привѣнчикомъ, глубоко-выемчатые. Коробочка продолговатая. 4. На горахъ. Сѣверъ, Востокъ. На сѣверѣ (Новая Земля) указана разновидность:

var. *exsara* (All.) D. C. Цвѣты сидячіе, вдвое меньше. Лепестки едва выемчатые.

1138. (10). *S. rupestris* L. Стебли вѣтвистые отъ основанія, прямые, голые. Листья ланцетные, острые. Цвѣты на длинныхъ цвѣтоножкахъ. Чашечка обратно-коническая, голая. Лепестки бѣлые или мясо-красные. 4. На горахъ. Сѣверъ, Финляндія.

1139. (11). *S. Armeria* L. Стебли прямые, простые или вверху немного вѣтвистые, голые съ клейкими узлами. Листья сизоватые, нижніе лопатчатые, верхніе овально-ланцетные, острые, у основанія полусердцевидно-стеблеобъемлющіе. Чашечка красноватая, съ овально-округлыми зубцами, по краю бѣло-окаймленными. Лепестки розовые съ привѣнчикомъ. Коробочка продолговатая. ⊙. На поляхъ и каменистыхъ мѣстахъ. Средн., Югъ, Юго-Западъ, Западъ.

var. *compacta* (Fisch). Соцвѣтіе густое. Листья нижніе ланцетно-лопатчатые, верхніе овально-продолговатые у основанія округло-стеблеобъемлющіе. ⊙. Югъ. *S. compacta* Fisch.

1140. (12). *S. longiflora* Ehrh. Стебли прямые, голые, вверху линкіе. Листья нижніе продолговато-ланцетные, острые, вытянутые въ длинный черешокъ, верхніе ланцетно-линейные. Чашечка длиной до 25 мм., длинноцилиндрическая. Лепестки бѣлые, двураздѣльные съ овально-продолговатыми долями, съ привѣнчикомъ. Коробочка продолговатая, на ножкѣ почти равной коробочкѣ. 4. По степямъ и каменистымъ мѣстамъ. Югъ, Крымъ.

1141. (13). *S. chlorantha* (Willd.) Ehrh. Стебли прямые, голые. Нижнія листья сближенные, лопатчато-удлиненные, суженные въ длинный черешокъ, у основанія рѣсничатый. Верхніе меньшіе, линейные, всѣ зубренно-рѣсничатые. Чашечка продолговато-булавовидная, зубцы чашечки овально-округлые, по краю бѣло-окаймленные, густо-рѣсничатые. Лепестки зеленоватые, глубокораздѣльные, ноготки лепестковъ выдаются изъ чашечки. 4. По сосновымъ лѣсамъ и песчанымъ мѣстамъ. По всей области.

1142. (14). *S. tatarica* (L.) Pers. Стебли прямые, слегка пушистые. Листья линейно-ланцетные, острые, по краю зубреные. Чашечка продолговато-булавчатая съ овальными островатыми зубцами, по краю бѣлопленчатыми, рѣсничатыми. Лепестки бѣлые, двураздѣльные безъ привѣнчика, ноготки лепестковъ выдаются изъ чашечки. Коробочка продолговатая на короткой ножкѣ. 4. По песчанымъ мѣстамъ и сосновымъ борамъ. По всей области.

1143. (15). *S. tenuis* Willd. Стебли прямые голые, или клейкіе, одиночные или образуютъ дерновинки. Листья скученные при основаніи стебля, узко-линейно-ланцетные или линейно-щетиновидные, голые, рѣдко пушистые, у основанія рѣсничатые, пленчато-расширенные стеблеобъемлющіе. Стеблевые

при основаніи съ рѣсничками. Цвѣты по одиночкѣ или по два. Чашечка цилиндрическая, голая или по жилкамъ слегка пушистая, съ продолговатыми, тупыми зубцами, по краю бѣло-перепончатыми. Лепестки бѣлые, безъ привѣнчика, двураздѣльные. Коробочка продолговатая. 4. На мѣлу. Югъ.

1137. (9). *S. acaulis* L. Стебли образуютъ густую дерновинку съ укороченными вѣточками. Листья скученные, линейные, острые, голые, у основанія рѣсничатые. Цвѣты сидячіе или на ножкахъ. Чашечка колокольчатая, красноватая, безъ жилокъ, съ тупыми, рѣсничатыми, яйцевидными долями. Лепестки розовые, съ маленькимъ привѣнчикомъ, глубоко-выемчатые. Коробочка продолговатая. 4. На горахъ. Сѣверъ, Востокъ. На сѣверѣ (Новая Земля) указана разновидность:

var. *exsara* (All.) D. C. Цвѣты сидячіе, вдвое меньше. Лепестки едва выемчатые.

1138. (10). *S. rupestris* L. Стебли вѣтвистые отъ основанія, прямые, голые. Листья ланцетные, острые. Цвѣты на длинныхъ цвѣтоножкахъ. Чашечка обратно-коническая, голая. Лепестки бѣлые или мясо-красные. 4. На горахъ. Сѣверъ, Финляндія.

1139. (11). *S. Armeria* L. Стебли прямые, простые или вверху немного вѣтвистые, голые съ клейкими узлами. Листья сизоватые, нижніе лопатчатые, верхніе овально-ланцетные, острые, у основанія полусердцевидно-стеблеобъемлющіе. Чашечка красноватая, съ овально-округлыми зубцами, по краю бѣло-окаймленными. Лепестки розовые съ привѣнчикомъ. Коробочка продолговатая. ⊙. На поляхъ и каменистыхъ мѣстахъ. Средн., Югъ, Юго-Западъ, Западъ.

var. *compacta* (Fisch). Соцвѣтіе густое. Листья нижніе ланцетно-лопатчатые, верхніе овально-продолговатые у основанія округло-стеблеобъемлющіе. ⊙. Югъ. *S. compacta* Fisch.

1140. (12). *S. longiflora* Ehrh. Стебли прямые, голые, вверху линкіе. Листья нижніе продолговато-ланцетные, острые, вытянутые въ длинный черешокъ, верхніе ланцетно-линейные. Чашечка длиной до 25 мм., длинноцилиндрическая. Лепестки бѣлые, двураздѣльные съ овально-продолговатыми долями, съ привѣнчикомъ. Коробочка продолговатая, на ножкѣ почти равной коробочкѣ. 4. По степямъ и каменистымъ мѣстамъ. Югъ, Крымъ.

1141. (13). *S. chlorantha* (Willd.) Ehrh. Стебли прямые, голые. Нижнія листья сближенные, лопатчато-удлиненные, суженные въ длинный черешокъ, у основанія рѣсничатый. Верхніе меньшіе, линейные, всѣ зубренно-рѣсничатые. Чашечка продолговато-булавовидная, зубцы чашечки овально-округлые, по краю бѣло-окаймленные, густо-рѣсничатые. Лепестки зеленоватые, глубокораздѣльные, ноготки лепестковъ выдаются изъ чашечки. 4. По сосновымъ лѣсамъ и песчанымъ мѣстамъ. По всей области.

1142. (14). *S. tatarica* (L.) Pers. Стебли прямые, слегка пушистые. Листья линейно-ланцетные, острые, по краю зубреные. Чашечка продолговато-булавчатая съ овальными островатыми зубцами, по краю бѣлопленчатыми, рѣсничатыми. Лепестки бѣлые, двураздѣльные безъ привѣнчика, ноготки лепестковъ выдаются изъ чашечки. Коробочка продолговатая на короткой ножкѣ. 4. По песчанымъ мѣстамъ и сосновымъ борамъ. По всей области.

1143. (15). *S. tenuis* Willd. Стебли прямые голые, или клейкіе, одиночные или образуютъ дерновинки. Листья скученные при основаніи стебля, узко-линейно-ланцетные или линейно-щетиновидные, голые, рѣдко пушистые, у основанія рѣсничатые, пленчато-расширенные стеблеобъемлющіе. Стеблевые

